GenSeq® RIP 试剂盒

GS-ET-006

Instruction Manual Version 2.3

(Updated, Mar 2025)

产品简介

RNA Immunoprecipitation (RIP) 是研究细胞内蛋白与RNA结合情况的技术，是研究转录后调控网络的有力工具。利用针对目标蛋白的特异性抗体，将目标蛋白及与之结合的RNA共沉淀下来，分离纯化后，就可以得到与目标蛋白结合的RNA。

GenSeq® RIP试剂盒专为RIP实验设计，包含了RIP流程中的所有核心试剂，具有更好的性价比。新研发的RNA纯化步骤在保证IP后RNA产量的同时减少实验时间。此外，试剂盒中包含了对照IgG抗体，便于用户进行实验质控，保证了实验的严谨性。优化过的实验流程极其简洁和高效，RIP实验后得到的RNA可以广泛应用于后续的定量RT-PCR (RIP-qPCR)、高通量测序 (RIP-Seq) 以及其它检测分析。

实验流程图

试剂盒组分 (12次反应*)	体积	保存条件
RIP Lysis Buffer	1.4 mL	4°C
Protease Inhibitor	7 µL	-20°C
RNase Inhibitor	70 µL	-20°C
PGM Beads	630 µL	4°C
10 × RIP Wash Buffer	9 mL	4°C
IgG antibodies	20 µL	-20°C
0.5 M EDTA	460 µL	4°C
10% SDS	90 µL	4°C
Proteinase K	100 µL	-20°C
MS Beads	260 µL	4°C
Buffer RLT	4.6 mL	4°C
Nuclease Free Water	500 µL	4°C

*: 此规格试剂盒可用于 6 次 RIP 反应 + 6 次 IgG 反应

试剂盒组分 (24 次反应*)	体积	保存条件
RIP Lysis Buffer	2.8 mL	4°C
Protease Inhibitor	15 µL	-20°C
RNase Inhibitor	140 µL	-20°C
PGM Beads	1250 µL	4°C
10 × RIP Wash Buffer	18 mL	4°C
IgG antibodies	40 µL	-20°C
0.5 M EDTA	1 mL	4°C
10% SDS	180 µL	4°C
Proteinase K	200 µL	-20°C
MS Beads	520 µL	4°C
Buffer RLT	9 mL	4°C
Nuclease Free Water	500 µL	4°C

*: 此规格试剂盒可用于 12 次 RIP 反应 + 12 次 IgG 反应

试剂盒组分 (48 次反应*)	体积	保存条件
RIP Lysis Buffer	5.6 mL	4°C
Protease Inhibitor	30 µL	-20°C
RNase Inhibitor	280 µL	-20°C
PGM Beads	2.5 mL	4°C
10 × RIP Wash Buffer	36 mL	4°C
IgG antibodies	80 µL	-20°C
0.5 M EDTA	2 mL	4°C
10% SDS	360 µL	4°C
Proteinase K	400 µL	-20°C
MS Beads	1040 µL	4°C
Buffer RLT	18 mL	4°C
Nuclease Free Water	800 µL	4°C

*: 此规格试剂盒可用于 24 次 RIP 反应 + 24 次 IgG 反应

自备材料

.....

- ✓ 磁力架（适配 1.5 mL EP 管）
- ✓ 移液枪及适配枪头（无核酸酶）
- ✓ 无核酸酶管（1.5 mL EP 管）
- ✓ 4 °C 离心机
- ✓ 旋转混匀仪或万向摇床
- ✓ 无水乙醇
- ✓ RIP Wash Buffer: 用无核酸酶水将试剂盒自带的 10× RIP Wash Buffer 稀释10倍

实验步骤

1. 样品预处理

◇ 配置 Complete Lysis Buffer

根据反应数，按下表配置合适体积的 Complete Lysis Buffer*，混匀后冰上放置备用。

	× 1	× N
RIP Lysis Buffer	100 μ L	100 μ L × N
Protease Inhibitor	0.5 μ L	0.5 μ L × N
RNase Inhibitor	0.25 μ L	0.25 μ L × N

*：一般而言，每个 RIP 反应约需 100 μ L Complete Lysis Buffer。

◇ 悬浮细胞

- 1) 取约 1×10^7 细胞在 4°C 1000×g 离心 5 min，收集细胞沉淀，吸弃上清。
- 2) 用 1 mL 冰上预冷的 1×PBS 重悬细胞沉淀，4°C，1000×g 离心 5 min，小心吸弃上清。
- 3) 重复步骤（2）一次。
- 4) 根据反应数，用合适体积的 Complete Lysis Buffer 重悬细胞，轻轻吹散细胞，放置在冰上裂解 5 min，转移至 -80°C 冻存。

◇ 单层细胞或贴壁细胞

- 1) 用 10 mL 冰上预冷的 1×PBS 清洗培养皿或培养瓶中的细胞两次。
- 2) 加入 10 mL 预冷 PBS 后用细胞刮将细胞刮下来，收集至 EP 管中。
- 3) 4°C，1000×g 离心 5 min，小心吸弃上清，收集细胞沉淀。
- 4) 根据反应数，用合适体积的 Complete Lysis Buffer 重悬细胞，轻轻吹散细胞，放置在冰上裂解 5 min，转移至 -80°C 冻存。

◇ 组织样品

- 1) 取 100 mg 新鲜组织，在冰上预冷的 1×PBS 中洗涤组织以去除血液等杂质。
- 2) 将清洗后的组织转移至适量预冷的 1×PBS 中，用匀浆器或其他细胞分离设备使组织分散为单个细胞。（注意：步骤（1-2）操作须迅速，尽量 5 min 内完成，避免时间太久导致 RNA 降解）。
- 3) 4°C，1000×g 离心 5 min，弃上清，收集细胞沉淀。
- 4) 根据反应数，用合适体积的 Complete Lysis Buffer 重悬细胞，轻轻吹散细胞，放置在冰上裂解 5 min，转移至 -80°C 冻存。

2. PGM 磁珠与抗体准备

- 5) 按反应数准备新的 1.5 mL EP 管，管上做好标记，如：样品名+抗体名。
- 6) 短暂振荡混匀 PGM Beads，分别取 50 μ L 至每个准备好的 EP 管中。
- 7) 每管加入 500 μ L RIP Wash Buffer，短暂振荡混匀。
- 8) 将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），小心吸弃上清，勿扰动磁珠。
- 9) 重复步骤 7) - 8) 一次。
- 10) 每管加入 100 μ L RIP Wash Buffer 重悬 PGM Beads 磁珠，每管分别加入 3-5 μ L 对应的目标抗体（RIP 抗体或 IgG 抗体）。
- 11) 在旋转混匀仪或万向摇床上，室温混匀 30 min。
- 12) 短暂离心后，将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），小心吸弃上清，勿扰动磁珠。
- 13) 每管加入 500 μ L RIP Wash Buffer，移液枪轻柔吹打混匀。
- 14) 将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），小心吸弃上清，勿扰动磁珠。
- 15) 重复步骤 13) - 14) 一次。
- 16) 将 EP 管从磁力架取下，加入 500 μ L RIP Wash Buffer，移液枪轻柔吹打混匀后置于冰上备用。

3. RIP 反应

- 17) 根据反应数，按下表配置 RIP Buffer:

RIP Buffer	$\times 1$	$\times N$
RIP wash Buffer	860 μ L	860 μ L $\times N$
0.5M EDTA	35 μ L	35 μ L $\times N$
RNase Inhibitor	5 μ L	5 μ L $\times N$

- 18) 将步骤 2 PGM 磁珠与抗体准备 12) 中的 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），弃上清。
- 19) 将 EP 管从磁力架取下，每管加入 900 μ L RIP Buffer，移液枪轻柔吹打混匀，置于冰上备用。
- 20) 将“样品预处理”中的样品从 -80 $^{\circ}$ C 冰箱中取出，快速融化后，4 $^{\circ}$ C，14000g 离心 10 min，小心转移上清至新的 EP 管中，勿扰动沉淀。
- 21) 针对每个样品：分别取 100 μ L 上清到步骤 3 RIP 反应 15) 结合了 RIP 抗体或 IgG 抗体的磁珠中，每管终体积为 1 mL（剩余上清可标记为“样品名，Input”，保存于 -80 $^{\circ}$ C 备用）。
- 22) 4 $^{\circ}$ C 旋转混匀仪或万向摇床上孵育 3 h 或过夜。

- 23) 短暂离心，将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），弃上清。
- 24) 加入 500 μL 冰上预冷的 RIP Wash Buffer 到磁珠中，移液枪轻柔吹打混匀。
- 25) 将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），小心吸弃上清，勿扰动磁珠。
- 26) 重复步骤 20) - 21) 五次（即：用冷 RIP Wash Buffer 清洗磁珠共计 6 次）。
- 27) 根据反应数，按下表配置蛋白酶 K 缓冲液*：

试剂	$\times 1$	$\times N$
RIP Wash Buffer	46.8 μL	46.8 $\mu\text{L} \times N$
10% SDS	6 μL	6 $\mu\text{L} \times N$
Proteinase K	7.2 μL	7.2 $\mu\text{L} \times N$
总	60 μL	60 $\mu\text{L} \times N$

*：蛋白酶 K 缓冲液需提前配置，防止未加溶液的磁珠放置时间过长。

- 28) 分别用60 μL 蛋白酶 K缓冲液重悬浮步骤3 RIP 反应 22) 中的磁珠。

选做步骤：如果后续实验需要用到 Input 对照的话，将“Input”样品从-80 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱取出，解冻后取 10 μL 到新的 EP管中，加入 60 μL 蛋白酶 K 缓冲液。

- 29) 55 $^{\circ}\text{C}$ 旋转混匀仪或万向摇床旋转孵育 45 分钟*。

*:实验过程中55 $^{\circ}\text{C}$ 旋转混匀仪或万向摇床旋转孵育45分钟此步骤没有对应的仪器可以替代的方法有三种：
1.使用恒混混匀仪；2.放置在55 $^{\circ}\text{C}$ 烘箱中，每隔5min移液枪吹打混匀；3.放置在55 $^{\circ}\text{C}$ 水浴锅，每隔5min移液枪吹打混匀，使用此方法需要注意不要污染；在此步骤中磁珠未均匀分散在EP管中，对IP后RNA产率有一定影响。

4. RNA纯化

- 30) 准备MS Beads:

- 用移液枪轻柔吹打混匀 MS Beads，按反应数准备新的1.5 mL EP管，分别取20 μL MS磁珠到 EP 管中；
- 将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），用移液枪吸弃上清，勿扰动磁珠；
- 将 EP 管从磁力架上取下，每管加入200 μL Buffer RLT，用移液枪轻柔吹打混匀；
- 将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），用移液枪吸弃上清，勿扰动磁珠；
- 将 EP 管从磁力架上取下，每管加入150 μL Buffer RLT，重悬 MS Beads。

- 31) 将步骤3 RIP 反应 25) 中的样品置于磁力架上待溶液澄清（约2 min），用移液枪转移 50 μL 上清到 150 μL 准备好的 MS Beads中，移液枪轻柔吹打混匀*。

*：RNA 纯化过程中产生絮状物属于正常情况。

- 32) 加入200 μL 无水乙醇，移液枪轻柔吹打混匀，室温孵育 5 min。
- 33) 将 EP 管放置在磁力架上待液体澄清（约2 min），移液枪吸弃上清，勿扰动磁珠。

-
- 34) 用无核酸酶水配置的75%乙醇漂洗 MS Beads:
- a. 保持样品始终处于磁力架上，加入500 μL 新鲜配制的75%乙醇漂洗磁珠（注意不要吹散磁珠）室温孵育30 s，小心移除上清；
 - b. 重复上述步骤（a）一次。
- 35) 室温干燥 2-5 min。
- 36) 加入11.25 μL Nuclease Free Water 重悬磁珠，室温孵育 2 min。
- 37) 将 EP 管置于磁力架上待溶液澄清（约 2 min），将10 μL 的上清转移到新的EP 管中，RNA样品立即用于后续实验或-80°C保存待用。

相关产品:

试剂盒	货号	规格
GenSeq® m6A MeRIP Kit	GS-ET-001	12T、24T、48T
GenSeq® m1A MeRIP Kit	GS-ET-002	12T、24T、48T
GenSeq® m5C MeRIP Kit	GS-ET-003	12T、24T、48T
GenSeq® m7G MeRIP Kit	GS-ET-004	12T、24T、48T
GenSeq® ac4C IP Kit	GS-ET-005	12T、24T、48T
GenSeq® RIP Kit	GS-ET-006	12T、24T、48T
GenSeq® O8G IP Kit	GS-ET-007	12T、24T、48T
GenSeq® Ψ IP Kit	GS-ET-008	12T、24T、48T
GenSeq Hi-C Kit	GS-EG-003	6T
GenSeq® Co-Immunoprecipitation (CoIP) Kit	GS-EG-008	12T、24T
GenSeq® CHIRP Kit	GS-EG-009	12T、24T
GenSeq® RNA Pull Down Kit	GS-EG-010	12T、24T
GenSeq® RCA DNA Amplification Kit	GS-MB-002	25T、100T

上海云序生物科技有限公司

服务电话：021-64878766

网址：<http://www.cloud-seq.com.cn>

地址：上海市松江区漕河泾莘砖公路518号24号楼4楼